

Active Ice® Spay Dr. Ritsert

Vážení pacienti,

Pozorně si přečtete tento informační leták. Obsahuje důležité pokyny ohledně použití tohoto přípravku. V případě otázek se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.

Informační leták pro pacienty

Active Ice® Spay Dr. Ritsert

Účinná látka: chloretan

Složení

Účinná látka: obsah 100 ml: 100 ml tekutého chloretanu

Balení a obsah

Sprej obsahuje 100 ml chloretanu, který se aplikuje na pokožku.

Aplikace

Jako lokální anestetikum (zchlazením)

Kontraindikace

Kdy chladicí spray Active Ice® Spay Dr. Ritsert nepoužívat?

Trpí-li postižená osoba alergií na chloretan.

Chloretan neaplikujte do otevřených ran.

Bezpečnostní opatření a upozornění

Jaká bezpečnostní opatření by měla být přijata?

- Aplikujte v otevřených, dobře větratelných prostorách.
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Předcházejte vdechnutí chloretanu při aplikaci v oblasti hlavy a krku.
- Nepoužívejte pro celkovou anestézii, kdy chloretan může mimo jiné způsobit vážné poruchy srdečního rytmu

Jaká bezpečnostní opatření je třeba přijmout v dopravě, při obsluze strojního zařízení nebo při práci ve vratkých pozicích?

Při použití v souladu s příbalovou informací by nemělo dojít k nežádoucím účinkům na řidiče nebo osoby obsluhující strojní zařízení.

Při vdechnutí chloretanu může být vaše schopnost reakce změněna do té míry, že může být narušena vaše schopnost aktivně se účastnit silničního provozu nebo obsluhovat strojní zařízení. Nebudete schopni reagovat dostatečně rychle a účelně na náhlé a nepředvídatelné situace. Proto v tomto stavu neříd'te motorové ani jiné vozidlo, neobsluhujte elektrické nářadí nebo strojní zařízení a nepracujte ve vratké pozici! Současně požitý alkohol by mohl narušit vaši schopnost řídit vozidlo ještě významněji.

Při jakých příležitostech je vhodné užití Active Ice® Spay Dr. Ritsert?

Lehké popáleniny kůže, sportovní poranění měkkých tkání, čerstvé pohmožděniny a výrony a další situace, kdy může aplikovaný chlad zamezit rozvoji změn ve tkáni, jako je krevní výron a podobně.

Jak a kdy chladicí spray Active Ice® Spay Dr. Ritsert?

Krátce aplikujte sprejem (několik sekund) na postiženou část těla zhruba ze vzdálenosti 30 cm.

Jak dlouho by se měl chladicí spray Active Ice® Spay Dr. Ritsert aplikovat?

Chladicí spray aplikujte pouze do té doby, dokud se nevytvoří sněhový ovlak.

Nesprávná aplikace a předávkování

Jak postupovat v případě nadměrné aplikace (záměrného nebo neúmyslného předávkování) přípravku Active Ice® Spay Dr. Ritsert?

V případě nadměrné aplikace chloretanu mohou vznikat omrzliny. Celkové příznaky intoxikace při vdechnutí chloretanu jsou neostře vidění, intoxikace, bezvědomí a případně i paralýza dýchacího a oběhového systému. Protiopatření mají kromě standardního postupu při intoxikaci napomoci plicní exkreci toxinu nucením k výdechu a preventivním podáním xylokainu (ventrikulární fibrilace). Z důvodu možného vzniku ventrikulární fibrilace v žádném případě nepodávejte sympatomimetické látky. Nepodávejte alkohol, mléko ani ricinový olej.

Vedlejší účinky

Jaké vedlejší účinky se mohou při aplikaci přípravku Active Ice® Spay Dr. Ritsert objevit?

Mohou se objevit alergické změny na pokožce. Při použití chloretanu v souladu s příbalovým letákem nebyly zjištěny další vedlejší účinky. Při příliš dlouhé aplikaci chloretanu sprejem mohou vznikat omrzliny. Pokud se u vás objeví vedlejší účinky, které tento leták neuvádí, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Pokyny a informace o trvanlivosti produktu

Doba použitelnosti je uvedena na nádobce.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Jak by měl být přípravek Active Ice® Spay Dr. Ritsert uchováván?

Uchovávejte na tmavém a chladném místě.

**ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSA DĚTÍ.**

Nelikvidujte nádobku, dokud není zcela prázdná.

Datum: Srpen 2004

