

Příbalová informace - Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

CONDROSULF 800

Chondroitini sulfas A natricus
sáčky (granulát)
potahované tablety

Dovozce

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Smluvní výrobce

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko

Držitel rozhodnutí o registraci

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení

Sáček:

Účinná látka: Chondroitini sulfas A natricus 800 mg v 1 sáčku (v 4 g granulátu)

Pomocné látky: kyselina citronová, sacharin, sorbitol, pomerančové aroma, oranžová žlut'

Potahovaná tableta:

Účinná látka: Chondroitini sulfas A natricus 800 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky: stearan hořečnatý

Indikační skupina

Specifické antirevmatikum, antiarthrotikum

Charakteristika

Chondroitinsulfát je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky.

Indikace

Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů (vzniklých opotřebením) zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a artróza kloubů prstů.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Kontraindikace

Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na účinnou látku a ostatní složky přípravku.

Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy a děti.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby. Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka. Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

Interakce

Nejsou dosud známé.

Dávkování

Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvykle se užívá následující dávkování:

Zahajovací léčba po dobu dvou týdnů:

2krát denně 1 sáček, resp. 1 potahovaná tableta po 800 mg.

Udržovací léčba po dobu 2 až 3 měsíců:

1krát denně 1 sáček anebo 1 potahovaná tableta po 800 mg.

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

CONDROSULF 800 granulát nebo potahovaná tableta se užívá před, při, anebo po jídle s dostatečným množstvím tekutiny. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Potahované tablety se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

Upozornění

Energetický obsah jednoho sáčku CONDROSULF 800 je 36,4 kJ (8,7 kcal).

Předávkování

Nebyly pozorovány žádné známky předávkování.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Přípravek se uchovává za obvyčejné teploty.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

Sáčky (granulát) po 800 mg: 30 a 90 sáčků (1 sáček = 4 g granulátu).

Potahované tablety po 800 mg : 30 a 90 potahovaných tablet.

Datum poslední revize: