

Informace pro použití, čtěte pozorně !

FLECTOR® EP GEL

Diclofenacum hydroxyethylpyrrolidinum (epoloaminum)
gel

Výrobce

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika

Smluvní výrobce

IBSA Institut Biochimique SA, Lugano, Švýcarsko

Držitel rozhodnutí o registraci

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení

Účinná látka: Diclofenacum hydroxyethylpyrrolidinum (epolaminum) v množství odpovídající 1 g Diclofenacum natricum ve 100 g gelu

Pomocné látky: makrogolmonostearát, makrogol, cetylstearylethylhexanoát, kyselina polyakrylová, trolamin, isopropylalkohol, parfém, čištěná voda

Indikační skupina

Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum pro místní použití.

Charakteristika

Účinnou látkou přípravku je diklofenak, který při zevním použití proniká kůží do podkožních tkání, kde působí protizánětlivě, snižuje tvorbu otoků a snižuje bolest.

Indikace

Přípravek FLECTOR EP GEL je určen pro lokální léčbu poúrazových stavů pohybového ústrojí, jako je pohmoždění kloubů, svalů a šlach. Je též indikován při lokální léčbě zánětlivých i degenerativních procesů v průběhu revmatických onemocnění, jakož i při léčbě projevů mimokloubního revmatismu (např. v léčbě bolestí v krční a křížobederní oblasti a bolestivosti svalových úponů).

Kontraindikace

Přípravek nesmí užívat nemocní se známou přecitlivělostí na diklofenak, kyselinu acetylsalicylovou, jiná nesteroidní antirevmatika nebo na jiné složky přípravku.

Přípravek není vhodný pro děti do 15 let.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů mohou užívat přípravek nemocní s průduškovým astmatem a kopřivkou, u nichž je zvýšena náchylnost ke vzniku nežádoucích účinků systémového charakteru.

Přípravek FLECTOR EP gel není vhodné aplikovat u žen v období těhotenství a kojení.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých nemocných se může v místě aplikace přípravku objevit svědění, pálení a zčervenání kůže, výjimečně kožní vyrážka a přecitlivělost na světlo.

Při užívání přípravky na větší plochy kůže po delší časové období nelze vyloučit systémové nežádoucí působení, které se může projevit jako astma, angioneurotický edém a urtikaria.

Interakce

Dosud není známo, že by přípravek měnil účinnost současně používaných jiných léků a naopak.

Dávkování a způsob použití

Gel se nanáší 3-4krát denně na postižené místo v množství 2-4 g. Při postižení svalů se přípravek vtírá pomocí lehké masáže do postiženého místa. Doba používání by neměla být delší než 14 dní.

Upozornění

FLECTOR EP gel se nesmí aplikovat na otevřené rány a na sliznice.

Uchovávání

Uchovávejte za obvyčejné teploty.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí

Balení

Tuba s obsahem 60 nebo 100 g gelu

Datum poslední revize

14.4.2004

