

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls1992/2006

## **Příbalová informace - Rp**

### **Informace pro použití, čtěte pozorně!**

# **CONDROSULF 800**

potahované tablety  
(Chondroitini natrii sulfas)

## **Výrobce**

IBI, spol. s r.o., Praha, Česká republika

## **Vyrobeno ve spolupráci**

IBSA Institut Biochimique SA, 6903 Lugano, Švýcarsko

## **Držitel rozhodnutí o registraci**

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

## **Složení**

*Léčivá látka:* Chondroitini natrii sulfas 800 mg v 1 potahované tabletě

*Pomocné látky:* Magnesium-stearát, potahovaná soustava Opadry OY-S-28903 bílá

## **Indikační skupina**

Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva

## **Charakteristika**

Chondroitinsulfát je jednou z hlavních součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a má charakteristickou význačnou schopnost vázat ve tkáni vodu. Zabezpečuje tím mechanické a elastické vlastnosti chrupavky.

## **Indikace**

Přípravek se užívá u degenerativních onemocnění kloubů (vzniklých opotřebením) zejména kolenního (gonartróza), kyčelního (koxartróza) a artrózy kloubů prstů.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

## **Kontraindikace**

Přípravek nesmí být užíván při přecitlivělosti na léčivou látku a ostatní složky přípravku.

Přípravek není určen pro těhotné a kojící ženy a děti.

## **Nežádoucí účinky**

Přípravek je obvykle dobře snášen, v ojedinělých případech se mohou objevit zažívací potíže (tlak v žaludku, pálení žáhy, nucení na zvracení), které obvykle nevedou k přerušení léčby.

Alergické reakce (např. kožní vyrážky) se vyskytují velmi zřídka.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

**Interakce**

Nejsou dosud známé.

**Dávkování**

Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvykle se užívá následující dávkování:

*Zahajovací léčba* po dobu dvou týdnů:

2krát denně 1 potahovaná tableta po 800 mg.

*Udržovací léčba* po dobu 2 až 3 měsíců:

1krát denně 1 potahovaná tableta po 800 mg.

Po skončení kúry se doporučuje tříměsíční přestávka a případné opakování léčebné kúry.

CONDROSULF 800 potahovaná tableta se užívá před, při, anebo po jídle s dostatečným množstvím tekutiny. Pacientům se zažívacími obtížemi se doporučuje užívání přípravku po jídle.

Potahované tablety se užívají nerozkousané a zapijí se vodou.

**Předávkování**

Nebyly pozorovány žádné známky předávkování.

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

**Uchovávání**

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

**Varování**

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obale.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

**Balení**

Potahované tablety po 800 mg : 30 a 90 potahovaných tablet.

**Datum poslední revize:**

28.4.2010