

**Pøíbalový leták: 53554 ARNIDOL SPRAY SPR SOL 1X100ML GPE D R**

45/617/00-C

Pøíbalová informace - VP

Informace pro použití, ètíte pozornì!

ARNIDOL SPRAY

- V:** Gehrlischer Pharmazeutische Extrakte GmbH + Co KG Eurasburg, SRN.
- DR:** Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, 81373 München, SRN.
- S:** 1 ml roztoku obsahuje:  
Hydroxyethylis salicylas 30 mg, Arnicae tinctura 100 mg.
- PL:** Isopropylmyristát, citronelová silice, kosodøevinová silice, levandulová silice, borovicová silice, blahovièníková silice, kafr, alkohol.
- IS:** Protizánìtlivý a protibolestivý pøípravek ve formì spreje.
- CH:** Arnidol spray je pøípravek pro zmírnìní pocitu únavy svalù a kloubù a pro urychlení regenerace pohybového ústrojí. Po nastøíkání na kùži prostupuje velmi dobøe do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otokù a tlumí místní zánìtlivou reakci. Nástup jeho úèinku je rychlý a je podporován alkoholem s pøísadou kafru a vonných silic, èímž zároveò pùsobí pøíjemnì chladivì.
- I:** Pøípravek se používá pøi svalové únavì, zhmoždìní, podvrtnutí a následných otocích, pøi stavech po nadmìrné námaze nebo pøetížení svalù a kloubù, vzniklém v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátíží. Použití pøípravek bez pøedchozího vyšetøení lékaøem smíte jen tehdy, není-li poranìna kùže, nejsou-li pøítomny krevní výrony, nezvìštuje-li se otok a není-li výraznì omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnù, je nutno poradit se s lékaøem v každém pøípadi.
- KI:** Arnidol spray nesmìjí používat osoby se zjištìnou pøecitlivìlostí na nikterou z jeho složek zejména na salicyláty, kyselinu salicylovou nebo arniku. Pøípravek nepoužívají tìhotné a kojící ženy a dìti do 15 let. U osob trpících nedostateèností ledvin nesmí se pøípravek používat na velké plochy kùže.
- NÚ:** Pøípravek je dobøe snášen, ale velmi vzácnì mùže vzniknout zarudnutí kùže, vyrážka nebo puchýøe.
- IT:** Salicyláty mohou pøi místním používání zvýšit propustnost kùže pro jiné souèasnì užívané pøípravky. Jestliže takové pøípravky používáte nebo hodláte používat, poraíte se s lékaøem døíve, než použijete Arnidol spray.
- D:** Arnidol spray nastøíkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovaèe na kùži postiženého místa tìla a postøik po 10-15 minutách opakujte nebo na místo pøiložte pøípravkem postøíkaný mulový obvaz. Toto ošetøení je

možno opakovať až 3krát denne. Pri postøiku držte lahvičku s prípravkom zvisle.  
Bez porady s lekárom nepoužívajte dlhšie než 14 dní.

**UZ:** Pretože prípravek obsahuje alkohol, nesmí sa dostať do očí, na sliznice a do otvorených rán!

**U:** Arnidol spray uchovávajte pri teplote do 25 st. C mimo dosah detí.

**VA:** Hošlavina! Nestøíkejte a prázdne lahvičky neodhazujte do otvoreného ohní!  
Po uplynutí doby použiteľnosti vyznaèené na obalu prípravok nepoužívajte!

**BA:** Lahvička s obsahom 50 ml alebo 100 ml s mechanickým rozprašovaèem.

**DZ:** 20.12.2000 (è.j. 20474/97)