

46/297/99-C

46/0896/96-S

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

SENSICUTAN

mast

v: Harras-Pharma Curarina GmbH, D-81373 Mnichov, SRN.

s: 100 g masti obsahuje: Heparinum natricum 20,000 m.j., Levomenolum 0,30 g.

PL: Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C 12 - C 16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol, alfa-acetát, dexpanthenol, rozpustný kolagen, kyselina citronová, mandlový olej, čištěná voda.

IS: Dermatologikum.

CH: Sensicutan je mast, která má vzhledem ke svému složení výrazně protizánětlivé, protisvědivé, hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky. Neobsahuje žádnou hormonální složku. Kromě toho zlepšuje látkovou přeměnu v povrchové vrstvě kůže a tím urychluje hojení.

I: Sensicutan mast se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě lupénky.

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

KI: Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na některou účinnou nebo pomocnou látku. Používání masti je nevhodné na otevřené rány, sliznice a mokvavé plochy, hlavně v zapáňkových oblastech. Přípravek není vhodné používat v těhotenství a při kojení a u pacientů s poruchami srážlivosti krve.

NÚ: Ojedinele se mohou vyskytnout příznaky kožní nesnášenlivosti, jako je zarudnutí nebo svědění u osob s přecitlivělou kůží nebo nesnášenlivostí některé ze složek přípravku. Tyto kožní projevy po vysazení masti obvykle velmi rychle vymizí. Při těžších alergických reakcích je nutno přerušit léčbu a vyhledat ihned lékaře.

IT: Přípravek nelze používat současně s některými jinými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Proto při používání jiných léků, a to na lékařský předpis i bez něj, je nutno poradit se se svým ošetřujícím lékařem. Při předepisování jiných léků je nutno lékaře upozornit na používání masti Sensicutan.

- D:** Pokud lékař nepředepsal jinak, nanáší se mast 2-3 krátkrát denně na postižená místa kůže. Hodí se i pro dlouhodobou léčbu několika týdnů. Nedostaví-li se však zlepšení (ústup zarudnutí a svědění) do týdne, je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho radou. V případě zhoršení příznaků musí být léčba přerušena a lékař vyhledán ihned.
- UZ:** Přípravek nesmí být nanášen na otevřené a mokvající rány, na sliznice nebo do očí.
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat ihned lékaře.
- U:** Uchovávejte za obvyčejné teploty.
- VA:** Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- BA:** Tuba s obsahem 30 g masti.
Tuba s obsahem 80 g masti.
- DZ:** 27.4.1999 (č.j. 6224/96)